

**AERO –RED®** COMPRIMIDOS MASTICABLES  
**SIMETICONA**

**COMPOSICIÓN por comprimido masticable:**

Simeticona 40 mg

Excipientes: Sacarosa, Sílice coloidal.

**FORMA FARMACEUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE:**

Comprimidos masticables: envases de 30 y 100 comprimidos masticables.

**ACTIVIDAD:**

AERO-RED es una silicona antiespumante, que destruye las burbujas de gas, facilitando su eliminación y aliviando las molestias que ocasiona.

**TITULAR Y RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN:**

URIACH AQUILEA OTC, S.L.; Av. Camí Reial, 51-57, 08184-Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

**INDICACIONES:**

Alivio sintomático de los gases (Aerofagia y meteorismo), con todas sus manifestaciones. Facilita el eructo.

**CONTRAINDICACIONES:**

Alergia a la simeticona o dimeticona.

**PRECAUCIONES:**

En caso de agravación o persistencia de los síntomas, consultar al médico.  
No exceder la dosis indicada.

**INTERACCIONES:**

No se han descrito.

**ADVERTENCIAS:**

**Embarazo y lactancia:**

**IMPORTANTE PARA LA MUJER:**

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

**Uso en niños:**

Consultar al médico.

**Efectos sobre la capacidad de conducción:**

No se han descrito.

**POSOLOGIA:**



Comprimidos masticables. Dos comprimidos masticables o más después de cada comida; no excediéndose la dosis de 10 comprimidos masticables por día.

Masticar bien los comprimidos antes de tragarlos (no deben tragarse enteros).

**SOBREDOSIFICACION Y SU TRATAMIENTO:**

Aunque no es de esperar fenómenos de intoxicación, en caso de ingestión accidental consulte a su médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Eructos. Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

**CADUCIDAD:**

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**CONSERVACION:**

No guardar en el cuarto de baño o en los lugares de elevada humedad.

**TEXTO REVISADO:** Octubre 1994

---

SIN RECETA MEDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA  
DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS

URIACH AQUILEA OTC  
Av. Camí Reial, 51-57  
08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

---